

Dott. Federico Di Tizio Medico Chirurgo - Specialista in Oftalmologia

STUDIO VIA DI VIGNA STELLUTI 26 – 00191 ROMA
TEL. 06.36303783
FAX 06.3291915
CELLULARE 335.8395159

STUDIO CORSO REGINA MARIA PIA 5- OSTIA ROMA
TEL. 0656324858

Roma

Schema terapeutico per intervento di chirurgia refrattiva

Prima dell'intervento:

Pr. Dicloftil collirio monodose

s. 1 goccia ogni 3 ore per 2 giorni prima dell'intervento.

Pr. Mepral compresse 20 mg

s. al mattino al digiuno dal giorno prima dell'intervento e per i sette giorni seguenti.

Pr. Toradol gocce

s. 30 gtt per via orale 30 minuti prima del trattamento laser.

Dopo l'intervento:

Pr. Toradol gocce

s. 20 gtt per via orale dopo 8 ore e poi altre 20 gtt, se necessario, dopo 8 ore.

Pr. Visucloben collirio

s. una goccia 2 volte al di per 30 giorni.

Pr. Nettacin collirio monodose

s. 1 goccia mattino, pomeriggio e sera per 2 settimane.

Pr. Dicloftil collirio monodose.

s. 1 goccia mattino pomeriggio e sera per 7 giorni.

Pr. Celluvisc 1% collirio monodose

s. 1 goccia per 6 volte al di per 2 settimane.

Dott. Federico Di Tizio
