

DOTT. FEDERICO DI TIZIO
MEDICO CHIRURGO - SPECIALISTA IN OFTALMOLOGIA

Sig./Sig.^{ra}: _____

Occhio da operare: OD OS

Intervento: Facoemulsificazione della cataratta con impianto di cristallino artificiale

Chirurgo: Dott. Federico Di Tizio

Anestesia: Topica (gocce di collirio anestetico di lidocaina 4%)

Assolutamente a digiuno Il giorno _____ alle ore _____

I PAZIENTI CHE POSSIEDONO UNA COPERTURA ASSICURATIVA SONO PREGATI DI INFORMARE IL MEDICO ALMENO UNA SETTIMANA PRIMA DELL'INTERVENTO, PER POTER APRIRE IN TEMPO UTILE LA PRATICA CON LA SOCIETA' ASSICURATRICE ED EVITARE DISGUIDI CHE POSSANO PORTARE ALLA MANCATA COPERTURA ECONOMICA DELL'INTERVENTO.

PREPARAZIONE PER L'INTERVENTO CHIRURGICO DI CATARATTA AMBULATORIALE

SI RICHIEDONO I SEGUENTI ESAMI:

- E.C.G. con visita cardiologia

- Analisi cliniche:
 - EMOCROMO
 - PT - PTT
 - AZOTEMIA
 - GLICEMIA
 - CREATININEMIA
 - ANTI HCV
 - ELETTROLITI

**N.B. E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RIPORTARE IN CLINICA IL
CONSENSO INFORMATO FIRMATO NELL'ULTIMA PAGINA**

ISTRUZIONE SUI FARMACI DA USARE PRIMA DELL'INTERVENTO

NEI TRE GIORNI CHE PRECEDONO L'INTERVENTO instillare nell'occhio da operare, Betabioptal collirio 1 goccia 4 volte al giorno e Yellox coll. 1 goccia 4 volte al giorno. Il Betabiotol coll. E lo Yellox coll. Dovranno essere instillati anche la mattina dell'intervento. Conservare il Betabioptal coll. in frigorifero una volta aperto.

ATTENZIONE LE TERAPIE MEDICHE PREESISTENTI (farmaci per il cuore, per la pressione, per il diabete etc.) salvo casi particolari per cui sarà opportuno parlare con il Dott. Di Tizio **NON DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE SOSPESE NEI GIORNI PRECEDENTI L'INTERVENTO!**

Ricordarsi di portare con se' in Clinica: una camicia aperta sul davanti, un paio di occhiali da sole per tornare a casa, un documento di riconoscimento valido, il codice fiscale, la biometria ed altri eventuali esami, la cartella clinica ed il consenso informato (firmato).

ISTRUZIONE SUI FARMACI DA USARE DOPO L'INTERVENTO

SUBITO DOPO L'INTERVENTO dovrà assumere, salvo diverse indicazioni, una compressa di Diamox un'ora dopo l'intervento, poi un'altra compressa (sempre di Diamox) dopo altre 6 ore. Se necessario sarà opportuno prenderne un'altra al mattino seguente .

Questo farmaco (diuretico), serve a ridurre l'aumento spontaneo della pressione oculare che si verifica nelle prime 12 ore dopo la chirurgia; serve inoltre a ridurre la cefalea che l'aumento della pressione oculare può provocare.

- Sarà necessario (non durante la notte) instillare Betabioptal collirio ogni 2 ore dopo l'intervento.

Abbiamo notato che molti pazienti non mettono le gocce nel pomeriggio dopo l'intervento: sono assolutamente necessarie!

- Il mattino dopo, al risveglio, bisogna ricominciare ad usare il collirio Betabioptal ogni 2 ore e lo Yellox 2 volte fino al controllo.



Per qualsiasi informazione inerente l'intervento la preghiamo di contattare il Dr. Di Tizio.

Riassumendo, è necessario procurarsi prima dell'intervento i seguenti farmaci facendoli eventualmente prescrivere dal proprio Medico di famiglia:

- Betabioptal collirio;
- Yellox collirio
- Diamox 250 mg. cpr.

E' DI FONDAMENTALE IMPORTANZA CHE, OLTRE A SEGUIRE LE ISTRUZIONI RELATIVE AI FARMACI, IL PAZIENTE SI ATTENGA ANCHE AI CONTROLLI POST-OPERATORI, CHE DEVONO ESSERE ESEGUITI:

- **IL GIORNO SEGUENTE LA CHIRURGIA**
- **7 GIORNI DOPO LA CHIRURGIA**
- **3 SETTIMANE DOPO**
- **I PRIMI DUE(2) CONTROLLI SONO COMPRESI NEL COSTO DELL'INTERVENTO. I SUCCESSIVI CONTROLLI SARANNO A PAGAMENTO**

Terapia Postoperatoria:

Pr. Betabioptal collirio

S. 1 goccia ogni 2 ore, compreso il giorno dell'intervento, fino alle 22.00. Riprendere ogni 2 ore la mattina successiva all'intervento fino al controllo.

Pr. Yellox collirio

S. 1 goccia 4 volte al giorno dalla mattina successiva al giorno dell'intervento per 1 mese

Le daremo poi ulteriori istruzioni.

Pr. Diamox compresse 250 mg

S. 1 cpr **dopo l'intervento,**

1 cpr dopo altre 6 ore,

1 cpr al mattino seguente se dovesse ancora avere cefalea.

Sarà utile che le signore non utilizzino trucchi di alcun tipo, fondo tinta, mascara, rossetto, a cominciare dal giorno precedente.

Fastidi postoperatorii:

Il giorno dell'intervento, dopo l'operazione, potrà avere cefalea, lacrimazione intensa e sensazione di corpo estraneo: questi sintomi scompaiono in 36-48 ore.

Per eliminare questi disturbi potrà assumere, se non vi sono controindicazioni gastroduodenali o di altro tipo, una bustina di Aulin oppure di farmaco generico identico, diluita in un bicchiere di acqua dopo aver mangiato qualcosa o comunque a stomaco pieno.

ISTRUZIONI PER IL PRIMO MESE DOPO L ' INTERVENTO

- **NON DEVE TOCCARSI L'OCCHIO OPERATO**
- **DEVE DORMIRE CON LA COPPETTA SULL'OCCHIO OPERATO PER 2 GIORNI**

N.B.: La pagina seguente è una ricetta medica valida a tutti gli effetti per potere acquistare direttamente in farmacia i prodotti da noi prescritti. Potete altrimenti farla vedere al Medico di Famiglia per ottenere la fornitura dei farmaci mediante il Sistema Sanitario Nazionale.

DOTT. FEDERICO DI TIZIO
MEDICO CHIRURGO - SPECIALISTA IN OFTALMOLOGIA

Roma,

Sig./Sir.^{ra}: _____

In previsione di intervento chirurgico per cataratta si prescrivono i seguenti farmaci:

Pr: Betabioptal coll. 1 flacone
Pr: Yellox coll. 1 flacone
Diamox 250 mg. cpr 1 scatola

Per ciò che riguarda la somministrazione ho fornito al paziente uno schema riassuntivo cui attenersi nei giorni che precederanno e seguiranno l'intervento chirurgico.

Dott. Federico Di Tizio

